

Évaluation motrice

| | D | G |
|------|---|---|
| C2 | | |
| C3 | | |
| C4 | | |
| C5 | | |
| C6 | | |
| C7 | | |
| C8 | | |
| T1 | | |
| T2 | | |
| T3 | | |
| T4 | | |
| T5 | | |
| T6 | | |
| T7 | | |
| T8 | | |
| T9 | | |
| T10 | | |
| T11 | | |
| T12 | | |
| L1 | | |
| L2 | | |
| L3 | | |
| L4 | | |
| L5 | | |
| S1 | | |
| S2 | | |
| S3 | | |
| S4-5 | | |

- Flexion du coude
- Extension du poignet
- Extension du coude
- Flexion du médus (P3)
- Abduction du 5° doigt

0 = paralysie totale
 1 = contraction visible ou palpable
 2 = mouvement actif sans pesanteur
 3 = mouvement actif contre pesanteur
 4 = mouvement actif contre résistance
 5 = mouvement normal
 NT, non testable

Score «motricité» : /100
 Contraction anale : oui/non

- Flexion de la hanche
- Extension du genou
- Dorsiflexion de cheville
- Extension du gros orteil
- Flexion plantaire de cheville

Score ASIA

Identité du patient

Date de l'examen

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Niveau neurologique* { Sensitif droite gauche
 { Moteur droite gauche

*Segment le plus caudal ayant une fonction normale

Lésion médullaire** : Complète ou Incomplète

** Caractère incomplet défini par une motricité ou une sensibilité du territoire S4-S5

Échelle d'anomalie ASIA : A B C D E

A = complète : aucune motricité ou sensibilité dans le territoire S4-S5

B = incomplète : la sensibilité mais pas la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel, en particulier dans le territoire S4-S5

C = incomplète : la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel et plus de la moitié des muscles testés au-dessous de ce niveau a un score < 3

D = incomplète : la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel et au moins la moitié des muscles testés au-dessous du niveau a un score ≥ 3

E = normale : la sensibilité et la motricité sont normales

Préservation partielle*** { Sensitif droite gauche
 { Moteur droite gauche

*** Extension caudale des segments partiellement innervés

Syndrome clinique : Centromédullaire
 Brown-Sequard
 Moelle antérieure
 Cône terminal

Évaluation sensitive

Toucher

Piqûre

| | D | G | | D | G |
|------|---|---|------|---|---|
| C2 | | | C2 | | |
| C3 | | | C3 | | |
| C4 | | | C4 | | |
| C5 | | | C5 | | |
| C6 | | | C6 | | |
| C7 | | | C7 | | |
| C8 | | | C8 | | |
| T1 | | | T1 | | |
| T2 | | | T2 | | |
| T3 | | | T3 | | |
| T4 | | | T4 | | |
| T5 | | | T5 | | |
| T6 | | | T6 | | |
| T7 | | | T7 | | |
| T8 | | | T8 | | |
| T9 | | | T9 | | |
| T10 | | | T10 | | |
| T11 | | | T11 | | |
| T12 | | | T12 | | |
| L1 | | | L1 | | |
| L2 | | | L2 | | |
| L3 | | | L3 | | |
| L4 | | | L4 | | |
| L5 | | | L5 | | |
| S1 | | | S1 | | |
| S2 | | | S2 | | |
| S3 | | | S3 | | |
| S4-5 | | | S4-5 | | |

Score «toucher» : /112
 Score «piqûre» : /112
 Sensibilité anale : oui/non

0 = absente
 1 = diminuée
 2 = normale
 NT, non testable

